

Brachychiton ou "*Kurrajong*"

Brachychiton populneus

STERCULIACÉES



Arbre persistant au port pyramidal de 15m de haut évoluant souvent en cépaie. Feuillage dense, brillant, vert sombre, tronc renflé. Fleurs en été, clochettes blanches, rosé à l'intérieur.

Culture

Sol drainé, acide mais tolérant le calcaire. Très résistant à la sécheresse. Multiplication par semis de graines fraîches ou par boutures semi-aoûtées.

En isolé ou en alignement.

Origine et climat requis

Est-Australien (Victoria)

Climat méditerranéen

Ethnobotanique

Du Grec *brachys* (court) et *chitôn* (tunique) en référence à la présence d'un duvet de soie protégeant la graine dans le fruit.

Exploité comme bois d'oeuvre. Plante fourragère exploitée à cet effet.

B. rupestris consommé par les aborigènes (sous-couche fibreuse de l'écorce).

Autres variétés / espèces

B. acerifolium
(New South Wales/Queensland)

Caduc, grandes feuilles brillantes palmées, fleurs rose foncé en été. H=20m.

B. discolor (N. South Wales/Queensland)

Caduc, feuilles palmées vert foncé dessus, argenté dessous. Multitude de fleurs roses en clochettes en juin, non rustique, H=20m.

B. rupestris (Queensland)

Persistant, tronc renflé, floraison jaune en juin, feuillage vert foncé, croissance rapide H=20m.



- 8°

