

Vipérine

Echium fastuosum (Syn. *Echium candicans*)

BORRAGINACÉES



Arbuste ligneux persistant (1m50) très architecturé, effet urticant.
Port architecturé arrondi à feuillage duveteux gris vert.
Inflorescences en épis dressés bleus au printemps.

Forte aptitude à l'hybridation, au ressemis spontané, faible durée de vie.

Culture

Sol neutre bien drainé, pauvre.
Multiplication par semis.

Tailler les inflorescences desséchées après
floraison, avant ou après l'été.

Plante à faible durée de vie (5-7ans).

Ethnobotanique

Echium vulgare (Europe) était utilisé
en Provence pour ses propriétés dépuratives.
La bourrache, plante chef de file de la famille
est préconisée pour ses vertus émoullientes
(fleurs), adoucissantes ou diurétiques
(tiges et feuilles).

Olivier de Serres (1600) la considérait
comme une plante alimentaire à consommer
à l'état juvénile en potage ou à la mode
de l'épinard.

Origine et climat requis

Ile de Madère

Climat méditerranéen littoral

Autres variétés / espèces

E. pininana (Archipel des Canaries)

Bisannuel, hampe florale de 3m
bleu lavande en début d'été.

E. simplex (Archipel des Canaries)

Bisannuel, hampe florale de 3m blanche.
Ces deux espèces s'hybrident entre elles.

E. wildpretii (Tenerife, Canaries)

Bisannuel non ligneux formant une rosette
de feuilles grises soyeuses, hampe florale
rouge clair de 1m50 sur les contreforts
du volcan du Teide (*Tenerife*).